Efectividad y seguridad de ritlecitinib en alopecia areata en vida real: estudio prospectivo bicéntrico

Manuel Sánchez Díaz, Marta Sánchez Díaz, Daniel Muñoz Barba, Pedro Navarro Guillamón, Enrique Herrera Acosta, Salvador Arias-Santiago

Hospital Universitario Virgen de las Nieves · Granada, Spain

INTRODUCCIÓN

La evidencia sobre la efectividad y seguridad de ritlecitinib en pacientes con alopecia areata (AA) tratados en condiciones de práctica clínica habitual continúa siendo limitada en nuestro medio. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad y seguridad de ritlecitinib en pacientes con AA en práctica clínica real, así como describir sus características clínicas, tratamientos previos y evolución de la afectación del cuero cabelludo y las cejas y pestañas.

MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio prospectivo observacional bicéntrico que incluyó pacientes con AA tratados con **ritlecitinib** en dos hospitales universitarios.
- Se recogieron variables demográficas, clínicas y de seguridad, incluyendo la puntuación *Severity of Alopecia Tool* (SALT), acontecimientos adversos e incidencias durante el tratamiento. La efectividad se evaluó mediante la evolución longitudinal del SALT y la proporción de pacientes que alcanzó SALT <20 a lo largo del tiempo.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Muestra
N = 34

Edad media
37.1 años

Mujeres:
52.9%

Duración media del episodio
10.6 años

Evolución > 8 años
61.8%

SALT basal
67.1%

AA total / universal
35.3%

AA cejas / pestañas
47.1% / 32.4%

Tratamientos previos


Corticoides orales: 100%


Inmunosupresores: 32,4%

Inhibidores JAK:
41.2% Baricitinib
17.6% Tofacitinib

RESULTADOS

Efectividad





Se observó una **mejoría significativa de SALT** y del porcentaje de pacientes con **SALT<20** a lo largo de 12 meses de tratamiento (*p<0,01*)

DATOS DE SEGURIDAD



No se detectaron efectos adversos graves

Los efectos hematológicos fueron transitorios

CONCLUSIONES

1 Efectividad progresiva

Ritlecitinib mostró efectividad progresiva en una cohorte de pacientes con larga evolución y múltiples tratamientos previos.

2 Seguridad favorable

No se detectaron efectos adversos graves durante el periodo de seguimiento. Los efectos adversos hematológicos fueron leves y transitorios